

XVIII

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ И СТЕНДОВЫХ СООБЩЕНИЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "НАУКА"

Москва 1982

В.М.Галушин, В.И.Перерва

СОСТОЯНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ ХИЩНЫХ ПТИЦ И СОВ В СССР

Во 2-е издание Красной книги СССР включено 18 видов хищных птиц и 1 вид сов.

Скопа. Редка, численность сокращается. На территории европейской части СССР обитает, вероятно, не более 2 тыс. пар, в целом по стране - в пределах 10 тыс. пар. Разрабатываются меры привлечения с помощью искусственных гнездовий.

Красный коршун. Редкий, периферийный вид. Граница ареала, возможно, отступает к западу. Отмечены современные гнездовья в Беловежской пуще (Белоруссия) и в среднем Приднестровье (Украина).

Европейский тувик. Очень редок. Численность существенно снизилась. Конфигурация современного ареала неясна. В последние годы известны только отдельные гнездовые находки.

Ястребинный сарнч. Периферийный вид. Численность не изучена.

Змеянд. Редок. Численность сокращается. В европейской части ареала находится под угрозой исчезновения. В Средней Азии некоторые местные популяции относительно стабильны. Например, в Бадкызском и Репетекском заповедниках (Туркмения) гнездовая плотность достигает 1-3 пар на 10 кв. км.

Степной орел. Западная часть ареала и общая численность вида сокращаются. На Украине сохранились единичные разрозненные гнездовья. В Калмыкии, Прикаспии и Западном Казахстане плотность населения относительно высокая - местами до 3-5 пар на 100 кв. км. Об-

чая численность в европейской части ареала, вероятно, выше 5 тыс. гнездящихся пар, на всей территории СССР обитает несколько десятков тысяч пар. Разработаны и внедряются технические устройства, предотвращающие гибель степных орлов на опорах электролиний, что ослабит губительное влияние одного из самых значимых факторов сокращения численности степного орла.

Орел-могильник. Редок. Северо-западная часть ареала сокращается, северо-восточная, — возможно, расширяется. В европейской части ареала численность падает, в азиатской — относительно стабильна. Всего в СССР гнездится несколько сотен пар.

Беркут. Редок. Численность в целом сокращается. В европейской части СССР южная граница ареала отступает к северу, а распространение становится пятнистым. Не исключено продвижение беркута к северу до крайних пределов лесной растительности. Всего в СССР обитает несколько тысяч пар.

Орлан-долгохвост. Исчезающий вид. В пределах СССР, возможно, уже не гнездится. Численность кочующих негнездовых орланов (в т.ч. молодых) составляет примерно сотню птиц. Необходимо обследование потенциальных мест гнездования и вольтерное разведение.

Орлан-белохвост. Редок. Численность в целом сокращается. Ареал на юге принял ленточный или пятнистый характер. Относительно стабильна, вероятно, гнездовая концентрация в низовьях Волги — 250–300 пар. В европейской части СССР обитает, видимо, свыше 500 пар, в целом по стране — несколько тысяч пар.

Белоплечий орлан. Эндемик СССР (если черный орлан из Кореи не относится к этому виду). Ареал и численность относительно стабильны. На Камчатке гнездится 500–1000 пар, видовая популяция, вероятно, превышает 2 тыс. гнездящихся пар.

Бородач. Редок. На Кавказе гнездится несколько десятков пар, всего в СССР — свыше сотни пар. Тенденции изменения численности не выяснены. Размножается в Алма-Атинском и Московском зоопарках.

Кумай. Редок. Численность не изучена.

Кречет. Редок. До недавнего времени численность определенно сокращалась. В последние годы обнаружены новые гнездовья на южном Ямале (порядка 12 пар на 1000 кв.км), в Большеземельской тундре, на Кольском п-ве, на Камчатке и в др. местах. Есть примеры восстановления бывших гнездовий, пустовавших десятилетиями (Кольский п-ов). На Ямале гнездится 60–80 пар. Общая численность в СССР составляет, вероятно, несколько сотен пар.

Балобан. Редок. Современные границы ареала требуют уточнения. Численность в европейской части страны снижается, в азиатской — относительно стабильна. Популяцию балобана в Молдавии оценивают в

262

20 пар, в Крыму — не более 5–6 пар. Высокая численность балобана (около 20 пар) сохраняется в Наурзумском заповеднике (Казахстан). В Иссык-Кульской котловине (Киргизия) гнездится до 15 пар балобана. Общая численность вида в СССР превышает тысячу пар. Первым из крупных соколов успешно размножился в вольерах Киргизского охотхозяйства.

Средиземноморский сокол. Исчезающий вид. Возможно, уже не гнездится на территории СССР. Известна единственная давняя (1949 г.) находка жилого гнезда в Азербайджане, а в последние годы — отдельные наблюдения в гнездовое время в Армении.

Шахин. Исключительно редок. В СССР заходит только северный край гнездового ареала. Общая численность в пределах 50 пар.

Сапсан. Угнетенный вид. Южная граница отступает к северу. Исчез в республиках Прибалтики. Сокращение численности отмечено на южном Ямале и во многих др. местах. В северной Белоруссии (Витебск. обл.) сохранилось 8–10 пар. На Ямале и Таймыре обитает 200–300 пар. В некоторых речных долинах с.-в. Якутии гнездо от гнезда находили в 5–15 км. Общая численность вида в СССР составляет, возможно, несколько тысяч пар, но продолжается ее сокращение.

Рыбный филин. Периферийный вид. В бассейне р. Бикин (Уссурийский край) на 350 км реки отмечено примерно 30 пар. Общая численность в СССР может быть оценена в несколько сотен пар.