

Краеведческие исследования в регионах России

Материалы Всероссийской научно-практической конференции

Ч. 1: Зоология

Орел 1996

С. 93-94

РЕДКИЕ ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ САРАТОВСКОГО ПРЕДВОЛЖЬЯ

*В. М. Галушин, А. Б. Костин, В. Н. Мосейкин, А. В. Генерозов, И. П. Мареев,
В. Э. Рейф*

Исследование выполнено летом 1995 г. на правом высоком берегу Волги, в Красноармейском р-не, Саратовской обл. Выделено две учетных площади по 120 кв. км каждая: в окрестностях села Садовое (90 кв. км леса) и села Белогорское у южной границы области (60 кв. км леса). Обследованная местность представляет собой остепненные пастбища, прорезанные глубокими оврагами. На плакорных участках, склонах северной экспозиции и в вершинах оврагов доминирует низкорослый (8 - 12 м) порослевый дуб, а по их сырým днищам преобладают высокоствольные березы, липы, ольхи и другие породы. С запада к обследованной территории примыкают сельскохозяйственные поля (частично заброшенные). Всего отмечено 15 видов достоверно или вероятно гнездящихся хищных птиц, в т.ч. 5 видов, включенных в Красную книгу России.

Европейский тювик. Не менее 26 пар достоверно гнездится на обследованной территории со средней плотностью 17,3 пар на 100 кв. км леса. Почти в каждом овраге и его отнорке обитает по 1 - 2 пары тювиков. Большинство гнезд устроено на высоте 14 - 22 м от земли, но не менее 5 пар гнездились низко (5 - 10 м от земли) на порослевых дубах. Слетки покинули гнезда в последней декаде июля. В добыче отмечали ящериц, мелких птиц и крупных бабочек

(бражников).

Орел - могильник. Отмечены две пары в 50 км друг от друга. На склоне оврага найдено необычайно низкое гнездо (6,5 м от земли, на березе), 9 июля в нем было 2 полностью оперенных слетка.

Змееяд. Учтено 4 пары ; гнездовая плотность (2,6 пар на 100 кв.км) - самая высокая из зарегистрированных для этого вида в России. Два найденных гнезда располагались типично

(в вершинной части порослевых дубов на высоте 8 - 9 м от земли) тогда как гнездо пятой пары (за пределами учетной площади севернее села Садовое) было необычайно крупным

(видимо, построено орланом или могильником). Орлан - белохвост. 3 пары живут в 5-10 км друг от друга. Два обнаруженных гнезда располагались на крутых склонах, построены

на березах в 7 и 9 м от земли.

Балобан. На волжском обрыве в 1991 г. было найдено жилое гнездо впоследствии покинутое

(возможно, это одно из самых северных гнездовых вида). Хотя в апреле 1995 г. здесь видели

взрослых балобанов, гнездо не найдено. Из относительно обычных хищных птиц преобладали канюк (не менее 28 гнездовых пар), обыкновенная пустельга (21 пара) и орел - карлик (16 пар). Реже встречались черный коршун (8 пар), осоед (5 пар), чеглок (4 пары ; два жилых гнезда располагались очень низко - у 8 м от земли), ястреб - татаревятник (2 пары) и ястреб - перепелятник (1 пара ; жилое гнездо с 4 слетками найдено на дне глухого оврага). Вне лесных участков постоянно встречались луговые (не менее 8 пар) и болотные луны (3 пары).

Не встречены ранее гнездившиеся здесь кобчик и степная пустельга. Суммарная плотность населения хищных птиц на обследованной территории исключительно высока : минимум 121 пара лесных видов (в среднем 80,6 пар на 100 кв. км леса) или 132 пары всех видов, включая луней (55 пар на 10 кв. км общей площади). Основные причины богатого разнообразия и высокой численности хищных птиц Саратовского Предволжья : 1) обилие доступной пищи

(суслики, сурки и мышевидные грызуны, мелкие птицы, ящерицы, змеи, прямокрылые и другие крупные насекомые ; 2) труднопроходимые древесные заросли в качестве гнездовых местообитаний ; 3) почти полное отсутствие фактора беспокойства в гнездовое время, главным образом из-за малой привлекательности для людей глубоких и густо облесенных оврагов. Потенциальную угрозу для хищных птиц представляет возможность нелегальной добычи редких видов ввиду высокой их концентрации. Обследованная территория является заказником, но несомненно заслуживает охранного статуса более высокого ранга.